

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

Dr. Carl Spengler (Davos)

SPENGLERSAN KOLLOID *Om*

Mischung

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Spenglersan® Kolloid Om jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach sechs Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Spenglersan® Kolloid Om und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan® Kolloid Om beachten?
3. Wie ist Spenglersan® Kolloid Om anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spenglersan® Kolloid Om aufzubewahren?
6. Weitere Angaben

1. Was ist Spenglersan® Kolloid Om und wofür wird es angewendet?

1.1. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopa-

thischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Symptomatisch nach den Regeln der Homöopathie;
Ätiologisch bei akuten Krankheitszuständen; Retrospektiv – ätiologisch bei subchronischem Krankheitsverlauf;
Bei klinisch stummen, latentem Infektionsverlauf, erkennbar durch das Wiederauftreten eines chronischen Leidens;
Anamnestisch bei bestehender familiär-hereditärer diathetischer Belastung;
Symptomatisch nach den Regeln der Homöopathie, insbesondere bei:

Schmerzen, Reinigung des Bindegewebes, Matrixentschlackung

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Hinweis: Bei einer Selbstbehandlung sollte darauf geachtet werden, dass bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden sollte. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan® Kolloid Om beachten?

- 2.1. Spenglersan® Kolloid Om darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich sind gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Spenglersan® Kolloid Om nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.
- 2.2. Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spenglersan® Kolloid Om ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spenglersan® Kolloid Om in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich bei der Anwendung des Arzneimittels bei älteren Menschen, für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.
- 2.3. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3. Wie ist Spenglersan® Kolloid Om anzuwenden?

Wenden Sie Spenglersan® Kolloid Om immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

3.1 Erwachsene und Kinder ab dem 12. Lebensjahr: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Sprühstöße in die Innenseite der Ellenbeuge einreiben. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 5 Sprühstöße in die Innenseite der Ellenbeuge einreiben. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenen-dosis. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

3.2 Art der Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren: Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Innenseite der Ellenbeuge und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Daumenballen in die Haut ein. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise aufzusprühen und einzureiben.

Art der Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren: Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße auf die Bauchhaut des Kindes und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Unterarm des Kindes ein.

Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Spenglersan® Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden. Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Spenglersan® Kolloid Om zu stark oder zu schwach ist.

3.3. Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan® Kolloid Om angewendet haben als Sie sollten, ist nicht mit Intoxikationen zu rechnen.

3.4. Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan® Kolloid Om vergessen haben, holen Sie diese Anwendung nicht nach, sondern fahren Sie mit der nächsten Einreibung fort.

3.5. Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan® Kolloid Om abbrechen, können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt bzw. Therapeuten befragen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben

sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Spenglersan® Kolloid Om aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Angaben

Was Spenglersan® Kolloid Om in 10 g enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Antigene aus <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Streptococcus pyogenes</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	2,22 g
Antigene aus <i>Streptococcus oralis</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Streptococcus pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Staphylococcus saprophyticus</i> subsp. <i>saprophyticus</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Neisseria sicca</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
Antigene aus <i>Mycobacterium bovis</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,11 g
gemeinsam potenziert über 8 Stufen.	

Sonstige Bestandteile: Thymol, Salzsäure 25% (m/V)

Spenglersan® Kolloid Om ist eine Mischung zur Anwendung auf der Haut und in Sprühflaschen mit 10 ml, 20 ml und 50 ml erhältlich.

Anwendung auf der Haut.

Zulassungsnummer: 3-00164

Hersteller:

Spenglersan GmbH, Steinfeldweg 13, 77815 Bühl, Deutschland

Tel: +49 (0)7223 3 06 71 Fax: +49 (0)7223 87 13

Email: info@spenglersan.de <http://www.spenglersan.de>

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet: Juni 2016.

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der SPENGLERSAN GmbH erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschland und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Ihre SPENGLERSAN GmbH